



带状疱疹ワクチン



シングリックス		乾燥弱毒生水痘ワクチン	
種類	不活化ワクチン (病原性をなくした細菌やウイルスの一部を成分としたワクチン)	生ワクチン (病原性を弱めた細菌やウイルスそのものを成分としたワクチン)	
対象者	50歳以上成人	50歳以上(带状疱疹予防) (免疫不全の病気の方免疫抑制剤を服用している方の接種禁)	
発症 予防効果	70歳以上 約 90% 50歳以上80歳未満 約 97%	50~59歳 約 60% 60歳以上 約 50%	
神経痛 予防効果	約 70%	約 30~60%	
予防期間	10年以上 確認済み	5年程度	
接種回数	2ヶ月間隔で 2回 接種 (遅くとも1回目から6ヶ月までに接種)	1回 (5年後再接種)	
注射部位	筋肉注射	皮下注射	
金額 (当院価格)	1回 18920円 2回で合計 37840円	1回	5500円
副反応	<頻度の多いもの> 注射部位の 痛み 赤み 腫れ 発熱 (ピークは当日と次の日) <その他> 筋肉痛 疲労 頭痛 悪寒発熱 胃腸障害など(多くは3.4日以内に治まります)	<5%以上> 注射部位の痛み 腫れ 発疹 痒み 熱感 発熱 <その他> 倦怠感 動悸 関節痛ど (多くは3.4日で治まります)	

詳しくは医師に相談してください。

くりばやし医院